

ESCAVOLISTA

TME Y LESIONES HABITUALES



Una lesión muy frecuente en escayolistas es la tendinitis crónica del **manguito de los rotadores** que se suele producir por trabajar con los codos elevados en tareas que demandan el uso continuado del brazo en posición de flexión elevada.

Estos movimientos de alcances por encima del nivel del hombro también pueden provocar la compresión de los nervios y vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro, es lo que se conoce como **síndrome de la salida torácica o costoclavicular**.



Las posturas forzadas de tronco y cuello (extensión, giro, etc) que adoptan los escayolistas para acceder a zonas complicadas o visionar continuamente la zona de trabajo (techo) provocan en muchos casos la aparición de **cervicalgias** y **dorsolumbalgias**.

FINANCIADO POR:



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN
ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN

TME Y LESIONES HABITUALES



Lumbalgia por posturas forzadas de tronco y manipulación manual de cargas.



Epicondilitis y **epitrocleítis** y, en general, **tendinitis** del miembro superior, principalmente asociadas a movimientos repetitivos y forzados de la articulación del codo y la muñeca. Son muy habituales en las tareas de realización de pasta, repasado de techos, etc.

Las posturas forzadas de la muñeca, especialmente los movimientos de extensión y flexión, pueden terminar provocando la aparición del conocido **síndrome del túnel carpiano** por la compresión del nervio mediano en la muñeca.

FINANCIADO POR:



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN
ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN